

TESTS MÉDICAUX RECOMMANDÉS POUR SURVEILLER LES EFFETS SECONDAIRES DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES ET NEUROLOGIQUES*

Classe	Médicaments	Tests médicaux	Fréquence
Antidépresseurs	Amitriptyline Fluoxétine Sertraline Clomipramine	Si c'est cliniquement indiqué, exemple: - Les taux de sodium en présence de symptômes d'hyponatrémie. - L'ECG si des ATCs sont administrés à une personne à risque de maladies cardiaques. - Le poids d'une personne souffrant de surpoids, etc.	Avant de commencer ou à des fins de suivi.
	Chlorpromazine Halopéridol Risperidone Zuclopenthixol decanoate	Poids, pouls et tension artérielle.	Avant de commencer, et puis une fois par mois au cours des 3 premiers mois, au bout d'un an et par la suite une fois par an.
Antipsychotiques	Clozapine	Lipides sanguins et glycémie à jeun (surtout en présence de facteurs de risque et en cas de prise des antipsychotiques de deuxième génération).	6 mois après l'initiation, au bout d'un an et par la suite une fois par an.
		ECG si c'est cliniquement indiqué (tension élevée ou en cas d'antécédents personnels de maladies cardiaques).	Avant de commencer, après 3 mois, au bout d'un an et par la suite une fois par an.
		FBS (il ne faut pas prescrire la clozapine s'il est difficile de procéder à ces contrôles réguliers en raison du risque de développer une agranulocytose potentiellement fatale).	Chaque semaine pendant 18 semaines, puis toutes les 2 semaines jusqu'à un an et par la suite une fois par mois.
		Poids, pouls et tension artérielle	Avant de commencer, et puis une fois par mois au cours des 3 premiers mois, au bout d'un an et par la suite une fois par an.
		Lipides sanguins et glycémie à jeun (surtout en présence de facteurs de risque).	6 mois après l'initiation, au bout d'un an et par la suite une fois par an.
		ECG si c'est cliniquement indiqué (tension élevée ou en cas d'antécédents personnels de maladies cardiaques).	Avant de commencer, après 3 mois, au bout d'un an et par la suite une fois par an.
Anxiolytiques	Diazépam Clonazépam	Pas besoin de tests de base ou de suivi.	
Antiépileptiques	Phénytoïne Lévétiracetam	Poids, urée, électrolytes, SGPT, SGOT, gammaGT, FSC	Avant de commencer. A refaire annuellement ou quand c'est cliniquement indiqué.

* Basé sur la "liste nationale des médicaments psychotropes et neurologiques pour la réponse humanitaire" disponible au site: www.moph.gov.lb
Se référer au "Guide de prescription rationnelle des médicaments pour le traitement des troubles mentaux et neurologiques prioritaires destiné aux spécialistes dans le système de santé publique" disponible aussi sur le site du ministère.

Classe	Médicaments	Tests médicaux	Fréquence
Antiépileptiques / Thymorégulateurs	Carbamazépine	Poids, urée, électrolytes, SGPT, SGOT, gammaGT, FSC	Avant de commencer. A refaire annuellement ou quand c'est cliniquement indiqué.
	Valproate de sodium	Taux sanguins de valproate de sodium (en comparaison avec le trouble affectif bipolaire, les taux sanguins de valproate de sodium ne sont pas requis sauf si l'on suspecte une non-adhérence du traitement ou une toxicité ou en cas de persistance de convulsion).	Jusqu'à la stabilisation de la dose au cours des premières semaines de traitement. Un contrôle continu est inutile sauf devant des preuves manifestes d'inefficacité, de non-adhérence du traitement ou d'une toxicité.
		Poids, SGPT, SGOT, gammaGT, FSC	Avant de commencer, puis à 6 mois, au bout d'un an puis chaque année.
		Test de grossesse	Avant de commencer (lorsque c'est applicable).
		Taux d'ammoniaque dans le sang	Devant des signes d'hyperammoniémie (confusion, léthargie, vomissement, crises convulsives).
	Lamotrigine	Pas besoin de tests de base ou de suivi.	
Thymorégulateur	Lithium <i>(Ne pas commencer le lithium si les tests ne sont pas faisables).</i>	Taux de lithium (avant la dose du matin et 12 heures après la dose du soir)	A chaque modification de la dose au cours des premières semaines, tous les 3 mois pendant la première année puis tous les 6 mois.
		Poids, FSC, urée, créatinine, TSH	Avant de commencer, puis chaque 6 mois.
		ECG	Avant de commencer, si c'est cliniquement indiqué.
		Test de grossesse	Avant de commencer (lorsque c'est applicable).